



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova /


Ministry of Internal Affairs

Policia e Kosovës / Policija Kosova / Kosovo Police

Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore



Virus Ebola



Virus Ebola


Ebola je jedna zarazna bolest dosta teška koja se prouzrokuje od virusa Ebola . Infekcija se dosta brzo širi i adekvatnu terapiju za njenu uspešno lečenje još nema, zbog tog razloga i smrtnost kod ovog bolesti je visoka .


Inkubacija vreme od trenutka infekcije ili do pojave kliničkih simptoma bolesti je 2-21 dan.

Poreklo virusa - poreklo virusa je nepoznata. Prema dosadašnjim podacima smatra se da je rezervuar virusa slepi miš .

Putevi proširenja bolesti su uglavnom na osnovu neposrednog kontakata krvi , sekrecije, organi i ostale telesne tečnosti zaražene stoke (infekcija od stoke kod čoveka) sa čoveka kod čoveka se prenosi samo preko krvi telesnih tečnosti i sekrecije (fekalije , mokraće , pljuvače i sperme) , zaraženog čoveka.

Može da se prenosi i kada lice sa oštećenom kožom ruke dolazi u dodiru sa kontamniranim ambijentom telesnim tečnostima pacijenta.







Klinički simptomi

bolesti – Jsu u glavnom
glavobolja, umornost ,
groznica mišićne bolesti
, konjuktiva i bradikardi (

osporeno otkucanje srca). Bolest se dosta brzo širi i ima
slučaja kada se pojave i egzantemi (crvenilo) kože . Bolest se
prati povrčanjem , prolivom i krvarenjem sa kože i sluznica , iz nosa,
i iz urođenitalnog trakta i gastrointestinala i na kraju sledi stanje
šoka gubljenjem svesti .

Kod trudnice prouzrokuje i abortuiranje . U 90% slučaja , bolest se
završava smrću.



Lečenje

– Kliničko stanje bolesnika
ovom bolešću je dosta teška brzinom
razvoja simptoma. Zahteva se hitno i
neprekidno lečenje. Pacijenti su dehidrirani
i zahtevaju što pre nadoknadu tečnosti na
oralni i intravenozni način. Takodje se daje i simptomatska terapija za
olakšavanje teških simptoma bolesti . Specifična terapija koja ometa
ili uništava virus ne postoji , kao alternativa u nekoliko slčaja se
koristi nazvani preparat Ribavirin

Rizične grupe - Najčešće bolesti se pojavljuje tokom letnjih meseci . Mogućnost od dodira Ebole, može da zahvata sve , bezobzira starosti , pola,profesije, narodnu pripadnost i td. Naj rizičniji od zahvata Ebolom, su : lovci koji su u dodiru sa zaraženom uginulom stokom , članovi porodice zaraženih lica , zdravstveni radnici, lica koja obavljaju verske rituale i sahranjivanje umrlih pacienata od Ebole.

Mere sprečavanja - i jedini način da se odbranimo od ove bolesti su:

Smanjivanje dodira sa zaraženom stokom
(žive ili uginule) ,

Neposredni kontakt sa zaraženim licima ,

Izolovanje bolesnih i osumnjičenih bolesnika ,

Korišćenje zaštitne odeće tokom kontaktiranja sa bolesnicima
(maske, kape, rukavice, mantile, naočare).

Korišćenje igle samo za jednu upotrebu ,

Istraživanje i neprekidni nadzor kontaktiranih lica,

Stalna dezinfekcija površine koja je u dodiru sa bolesnicima ,

Seksualno uzdržavanje ,

Lica koja obavljaju verske rituale i sahranjivanje umrlih pacienata od Ebole treba da imaju zaštitnu odeću.

